ZAHN- WWW. SAHN- WWW. SAHN- WWW. SHOWN THE SERVICE OF THE SERVICE

Korrektes Verhalten ist von Bedeutung!

Folgende Angaben sind bei jedem Zahnunfall wichtig:

- Was genau ist passiert, wann, wie und wo?
- Alter der Verletzten
- Sind Milch- oder bleibende Zähne betroffen?
- Bei offenen Wunden ist möglicherweise eine Tetanus-Impfung (Wundstarrkrampf) notwendig. Impfbuch checken und/oder Hausarzt kontakten!

Starke Blutungen sollten durch das Anlegen eines Stofftuchs oder Verbandes gestoppt werden. Bei größeren Verletzungen suchen Sie bitte die Notaufnahme auf. Bei Anzeichen einer Hirnerschütterung wie Schwindel, Erbrechen oder ungleich großen Pupillen ist sofortiger Kontaktmitdem Hausarztoder Krankenhauserforderlich. Alle Zahnunfälle müssen umgehend der Versicherung gemeldet werden, da sich das volle Ausmaß eines Zahnunfalls in manchen Fällen erst Jahre später zeigt.

MILCHZÄHNE



Abgebrochen

Bei kleineren abgebrochenen Stücken sollte innerhalb weniger Tage eine Zahnarztpraxis aufgesucht werden. Im Falle einer Blutung sollte noch am selben Tag eine Zahnarztpraxis besucht werden.



Gelockert

Die Behandlung ist nicht dringend, jedoch empfiehlt es sich, innerhalb weniger Tage eine Zahnarztpraxis aufzusuchen.



Verschoben

Es ist ratsam, möglichst sofort eine Zahnarztpraxis oder Zahnklinik aufzusuchen, da nur am selben Tag der Zahn möglicherweise an seinen richtigen Platz gedrückt werden kann.



Herausgeschlagen

Die Behandlung ist nicht dringend, da es meist nicht sinnvoll ist, ausgeschlagene Milchzähne wieder einzusetzen. Dennoch empfiehlt es sich, innerhalb weniger Tage eine Zahnarztpraxis aufzusuchen.



Hineingeschlagen

Eine Behandlung ist selten erforderlich. Dennoch ist es wichtig, die Zahnarztpraxis zu informieren, da es Risiken für Folgeschäden für den nachrückenden bleibenden Zahn geben kann. Die Zahnkeime für die bleibenden Zähne befinden sich unter oder hinter den Milchzähnen und befinden sich in einem empfindlichen Entwicklungsstadium. Einwirkungen können den normalen Wachstumsverlauf stören und verschiedene Defekte am bleibenden Zahn verursachen.





Abgebrochen

Je größer der abgebrochene Teil ist, desto dringender ist eine Behandlung (innerhalb von Stunden!). Es ist ratsam, große abgebrochene Stücke mitzunehmen, da sie möglicherweise wieder angeklebt werden können.



Gelockert

Eine Behandlung ist dringend erforderlich.
Möglicherweise muss der Zahn innerhalb von
Stunden mit einer Schiene fixiert werden, um sich
seinen Platz zu sichern.



Verschoben

Eine Behandlung ist dringend erforderlich. Der Zahn muss innerhalb von Stunden an seinen Platz gedrückt und dort mit einer Schiene fixiert werden.



Hineingeschlagen

Eine Behandlung ist dringend erforderlich und sollte innerhalb von Stunden erfolgen. Der Zahn muss an seinen richtigen Platz gebracht werden.



Herausgeschlagen

Wenn möglich, den Zahn sofort wieder einsetzen! Andernfalls sollte er sofort in die Zahnarztpraxis oder Zahnklinik gebracht werden. Berühren Sie niemals die Zahnwurzel, sondern nur die Zahnkrone, und reinigen oder desinfizieren Sie den Zahn nicht. Zur Aufbewahrung des Zahns während des Transports legen Sie ihn in eine Zahnrettungsbox, die in Apotheken erhältlich ist. Alternativ ist eine kurzzeitige Zahnlagerung in gekühlter H-Milch, steriler Kochsalzlösung oder Frischhaltefolie möglich.

